

ÜRÜNLERİNİZDE FARK YARATIR



eurobiosys

ORİJİNAL ÜRÜN GRUBU KATOLOĞU



EC FERTİLİZER - NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ ÜRÜN GRUBU



Euro Drip 20-10-20

EC FERTİLİZER (NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ)

ÜRÜNLER	KULLANIM DÖNEMİ	DOZ
SERA ÜRÜNLERİ VE AÇIK TARLA SEBZECİLİĞİ	DİKİMDEN İTİBAREN	500-1500 gr/da/gün DAMLAMA İLE
MEYVE AĞAÇLARI	MEYVE TUTUMUNDAN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
TAHİL ÜRÜNLERİ	KARDEŞLENMEDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ	DİKİMDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA

BAYİ ALIŞ FİYATI:

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:

DEPOLAMA DURUMU:Kapalı ambalajında ve 0/+45 derece arasındaki sıcaklıklarda depolandığı taktirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden , su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde , ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi havalandırma sağlanmalıdır. Depolama sırasında güneş ışığına mağruz bırakılmamalıdır. **KARİŞİBİLİRLİK:**Genel olarak birçok pestisit ve gübre ile sorunsuz bir şekilde karışabilir.Karışımından emin olmak için mutlaka ön karışım testi yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar kimyevi gübrelerin kalitesini garanti eder. İmalatçıları kimyevi gübrelerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

UYARILAR: DİKKAT! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlere kullanınız.



Euro Drip 16-8-24

EC FERTİLİZER (NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ)

ÜRÜNLER	KULLANIM DÖNEMİ	DOZ
SERA ÜRÜNLERİ VE AÇIK TARLA SEBZECİLİĞİ	DİKİMDEN İTİBAREN	500-1500 gr/da/gün DAMLAMA İLE
MEYVE AĞAÇLARI	MEYVE TUTUMUNDAN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
TAHİL ÜRÜNLERİ	KARDEŞLENMEDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ	DİKİMDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA

BAYİ ALIŞ FİYATI:

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:

DEPOLAMA DURUMU:Kapalı ambalajında ve 0/+45 derece arasındaki sıcaklıklarda depolandığı taktirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden , su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde , ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi havalandırma sağlanmalıdır. Depolama sırasında güneş ışığına mağruz bırakılmamalıdır. **KARİŞİBİLİRLİK:**Genel olarak birçok pestisit ve gübre ile sorunsuz bir şekilde karışabilir.Karışımından emin olmak için mutlaka ön karışım testi yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar kimyevi gübrelerin kalitesini garanti eder. İmalatçıları kimyevi gübrelerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

UYARILAR: DİKKAT! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlere kullanınız.



Euro Drip 18-18-18

EC FERTİLİZER (NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ)

ÜRÜNLER	KULLANIM DÖNEMİ	DOZ
SERA ÜRÜNLERİ VE AÇIK TARLA SEBZECİLİĞİ	DİKİMDEN İTİBAREN	500-1500 gr/da/gün DAMLAMA İLE
MEYVE AĞAÇLARI	MEYVE TUTUMUNDAN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
TAHİL ÜRÜNLERİ	KARDEŞLENMEDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ	DİKİMDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA

BAYİ ALIŞ FİYATI:

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:

DEPOLAMA DURUMU:Kapalı ambalajında ve 0/+45 derece arasındaki sıcaklıklarda depolandığı taktirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden , su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde , ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi havalandırma sağlanmalıdır. Depolama sırasında güneş ışığına mağruz bırakılmamalıdır. **KARİŞİBİLİRLİK:**Genel olarak birçok pestisit ve gübre ile sorunsuz bir şekilde karışabilir.Karışımından emin olmak için mutlaka ön karışım testi yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar kimyevi gübrelerin kalitesini garanti eder. İmalatçıları kimyevi gübrelerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

UYARILAR: DİKKAT! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlere kullanınız.



Euro Drip 10-52-10

EC FERTİLİZER (NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ)

ÜRÜNLER	KULLANIM DÖNEMİ	DOZ
SERA ÜRÜNLERİ VE AÇIK TARLA SEBZECİLİĞİ	DİKİMDEN İTİBAREN	500-1500 gr/da/gün DAMLAMA İLE
MEYVE AĞAÇLARI	MEYVE TUTUMUNDAN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
TAHİL ÜRÜNLERİ	KARDEŞLENMEDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ	DİKİMDEN İTİBAREN	750-1000 gr/ton SUYA YAPRAKTA

BAYİ ALIŞ FİYATI:

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:

DEPOLAMA DURUMU:Kapalı ambalajında ve 0/+45 derece arasındaki sıcaklıklarda depolandığı taktirde ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinde tolerans dışında bir değişiklik olmaz. Gıda ve yiyeceklerden , su kaynaklarından uzak yerlerde depolayınız. Serin ve kuru yerlerde , ahşap ızgaralar üzerinde depolanmalıdır ve iyi havalandırma sağlanmalıdır. Depolama sırasında güneş ışığına mağruz bırakılmamalıdır. **KARİŞİBİLİRLİK:**Genel olarak birçok pestisit ve gübre ile sorunsuz bir şekilde karışabilir.Karışımından emin olmak için mutlaka ön karışım testi yapılarak kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI:Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar kimyevi gübrelerin kalitesini garanti eder. İmalatçıları kimyevi gübrelerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

UYARILAR: DİKKAT! Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.Elle taşıma esnasında eldiven giyiniz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Gübre ile temas eden vücut kısımlarını bol su ile yıkayınız.Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Asla uygun doz oranlarını aşmayınız. Sadece gerekli olan yerlere kullanınız.



eurobiosys



PROOF CAB EC FERTİLİZER (KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ)

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
SERA SEBZELERİNDE	DİKİMDEN 3 HAFTA SONRA 2-3 HAFTA ARAYLA	100 lt suya 200-300cc	1-2 lt/da
AÇIK ALAN SEBZELERİNDE	ÇİÇEK ÖNCESİ VE ÇİÇEK SONRASI 15 GÜN ARA İLE	100 lt suya 200-300cc	1-2 lt/da
ÇİLEK VE AHUDDU	ÇİÇEK ÖNCESİ VE ÇİÇEK SONRASI 15 GÜN ARA İLE	100 lt suya 200-300cc	1-2 lt/da
Y.ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	ÇİÇEKTEN 3 HAFTA SONRA 2-3 UYGULAMA	100 lt suya 200-300cc	1-2 lt/da
S.ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	ÇİÇEKTEN 3 HAFTA SONRA 2-3 UYGULAMA	100 lt suya 200-300cc	1-2 lt/da
BAĞLARDA	İNCE VE KORUK DÖNEMİNDE 2 UYGULAMA	100 lt suya 200-300cc	1-2 lt/da
NARENCİYE,MUZ VE FINDIK	ÇİÇEK ÖNCESİ VE ÇİÇEK SONRASI 15 GÜN ARA İLE	100 lt suya 200-300cc	1-2 lt/da
HUBUBAT	KARDEŞLENME DÖNEMİ VE 15 GÜN SONRA	100 lt suya 100-200cc	1-2 lt/da
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	ÇAPADAN SONRA 15 GÜN ARA İLE	100 lt suya 100-200cc	1-2 lt/da
SÜS BİTKİLERİ	YAPRAKLANMA DÖNEMİ VE SONRASI	100 lt suya 100-150cc	1-2 lt/da

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

PROOF CU EC FERTİLİZER (BAKIRLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ)

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN UYGULAMA
SEBZELERİNDE;(DOMATES,BİBER,HIYAR,PATLICAN,KABAK,FASULYE,BEZELYE,MARUL,SOĞAN VE HAVUC)	DİKİMDEN 3 HAFTA SONRA 2-3 HAFTA ARAYLA	100 lt suya 150-200cc
ÇİLEK VE AHUDDU	ÇİÇEK ÖNCESİ VE ÇİÇEK SONRASI 15 GÜN ARA İLE	100 lt suya 100-150cc
Y.ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	ÇİÇEKTEN 3 HAFTA SONRA 2-3 UYGULAMA	100 lt suya 100-150cc
S.ÇEKİRDEKLİ MEYVELER	ÇİÇEKTEN 3 HAFTA SONRA 2-3 UYGULAMA	100 lt suya 100-150cc
BAĞLARDA	İNCE VE KORUK DÖNEMİNDE 2 UYGULAMA	100 lt suya 100-150cc
NARENCİYE	ÇİÇEK ÖNCESİ VE ÇİÇEK SONRASI 15 GÜN ARA İLE	100 lt suya 100-150cc
HUBUBAT(BUĞDAY,ARPA,ÇELTİK,BURÇAK VE YULAF)	KARDEŞLENME DÖNEMİ VE 15 GÜN SONRA	100 lt suya 100-150cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (KİMYON,SOYA,ANASON,PAMUK,Ş.PANCARI,MISIR,PATATES,YER FISTIĞI,TÜTÜN VE MERCİMEK)	ÇAPADAN SONRA 15 GÜN ARA İLE	100 lt suya 100-150cc
SÜS BİTKİLERİ	YAPRAKLANMA DÖNEMİ VE SONRASI	100 lt suya 100-150cc
DAMLAMA SU İLE	500cc/da	

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

PROOF ZN EC FERTİLİZER (ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ)

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA DOZU
SEBZELER (PATLICAN, HIYAR VS.)	AKTİF GELİŞME DÖNEMİNDE	100-150 g/da
NARENCİYE	İLKBAHAR SÜRGÜNLERİ GELİŞİMİNİN 2/3 ÜNDE,HENÜZ SERTLEŞMEDEN GEREKİRSE MEYVE TUTUNUMUNU TAMAMLADIKTAN SONRA	100-150 g/da
MEYVELER (ELMA,ARMUT,A.FISTIĞI)	İLKBAHAR GELİŞİMİ BAŞLAMASIYLA ÇİNKO NOKSANLIĞINIGİDERME PROGRAMI OLARAK	100-150 g/da
PATATES	ÇİNKO NOKSANLIĞINI GİDERME PROGRAMI OLARAK	100-200 g/da
KIŞLIK TAHİL	1-KARDEŞLENME BAŞLANGICI BELİRDİĞİNDE 2-BİRİNCİ BOĞUM BELİRDİĞİNDE 3-BAYRAK YAPRAK GÖRÜLDÜĞÜNDE	100-150 g/da 100-150 g/da 100-150 g/da
BAĞ	TAM ÇİÇEKLENMEDEN 2 HAFTA ÖNCE	100-150 g/da

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

EC FERTİLİZER - ÇÖZELTİ ÜRÜN GRUBU



FUEGO 7-21-0 +ME EC FERTİLİZER (NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ)

BİTKİLER	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA
DOMATES,SALATALIK,PATLICAN	1,5-2,0 lt/da	100 lt suya 150-200cc
AÇIK ALAN SEBZELERİNDE;(MARUL,LAHANA,KARNABAHAHAR,KABAK,KARPUZ,KAVUN)	2,0-3,0 lt/da	100 lt suya 150-200cc
SERALARDA-ÖRTÜ ALTİ SEBZECİLİK	2,0-2,5 lt/da	100 lt suya 150-200cc
KESME ÇİÇEKÇİLİKTE	1,0-1,5 lt/da	100 lt suya 150-200cc
Y. ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE (ELMA,ARMUT VB.)	2,0-3,0 lt/da veya Ağaç başına 30-50cc	100 lt suya 150-200cc
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE (KAYISI,ŞEFTALİ,KIRAZ VB.)	2,0-3,0 lt/da veya Ağaç başına 30-50cc	100 lt suya 150-200cc
NARENCİYE	2,0-3,0 lt/da veya Ağaç başına 30-50cc	100 lt suya 150-300cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE;(PAMUK,SOYA,MISIR,AYÇİÇEĞİ VB.)	1,0-1,5 lt/da	100 lt suya 150-300cc
TAHILLARDA (BUĞDAY,ARPA) YEŞİL VE ÇİM ALANLARDA	1,0-1,5 lt/da	100 lt suya 150-250cc

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

FUEGO N 15-0-0 EC FERTİLİZER (AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ)

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ (DOMATES, BİBER,PATLICAN,SALATALIK,ÇİLEK, KAVUN,KARPUZ VB.)	Fideler şaşırtıldıktan 1 haftasonra Çiçeklenme döneminde İlk meyve tutumunan sonra İlk hasattan önce	150cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
AĞAÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ(ELMA,KIRAZ, ŞEFTALİ,ARMUT,TURUNCĞİLLER, FINDIK,AYVA,KAYISI,FISTIK VB.)	Fideler şaşırtıldıktan 1 haftasonra Meyve tutumunan sonra (pettaller düşünce)	200cc / 100 lt su 250cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
BAĞ	İlk yaprakları açtığı dönemde Çiçeklenme ve salıkım uzatmada Koruk döneminde Meyvelere ben düşmeden	200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 250cc / 100 lt su	1 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
HUBUBAT(BUĞDAY,ARPA,NOHUT MISIR VB.)	Kardeşlenme dönemi öncesi ve Bitki boyu 10 cm olunca	100cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da
SÜS BİTKİLERİ	Çiçekler 3-5 yapraklı iken Çiçek tohumcuğunun oluşumu öncesi İlk meyve dökümünden önce	200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
YAPRAĞI YENEN BİTKİLER	Bitki boyu 10 cm olunca	100cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:





FUEGO 0-0-27

EC FERTİLİZER (POTASYUM ÇÖZELTİSİ)

BİTKİLER	TOPRAKTAN UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA
SERA SEBZECİLİĞİ (DOMATES,BİBER, PATLİCAN,SALATALIK,FASULYE BEZELYE)	Meyveler fındık büyüklüğüne gelince damlama su ile 15 günde bir 2-3 lt/da	100lt suya 200cc
AÇIK ALAN SEBZECİLİĞİ (DOMATES, BİBER,PATLİCAN,SALATALIK, FASULYE,BEZELYE)	Meyveler fındık büyüklüğüne gelince damlama su ile 15 günde bir 2-4 lt/da	100lt suya 200cc
YAPRAĞI YENEN BİTKİLER	Bitki boyu 10 cm'ye gelince damlama sulama ile 15 günde Bir 2-3 lt/da	100lt suya 200cc
ÇİLEK	Meyveler fındık büyüklüğüne gelince damlama sulama ile 15 günde bir 2-3 lt/da	100lt suya 200cc
KAVUN,KARPUZ,KABAK	Meyveler fındık büyüklüğüne gelince damlama sulama ile 15 günde bir 2-3 lt/da	100lt suya 200cc
TURUNÇGİLLER	Yapraktan hasata kadar üç tekerrürde ilkbahar da damlama sulama ile 2-3lt/da Meyveler fındık büyüklüğüne gelince 2-3lt/da	100lt suya 200cc
MEYVE AĞAÇLARI	ilkbahar da damlama sulama ile 3 kg/da Meyveler fındık büyüklüğüne gelince 2-3lt/da Sonbaharda 2-3 lt/da	100lt suya 200cc
ASMA	ilkbahar da damlama sulama ile 1-2 kg/da Meyveler fındık büyüklüğüne gelince 2-3lt/da Sonbaharda 1-2 lt/da	100lt suya 200cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	Bitki boyu 10 cm'ye gelince damlama sulama ile 15 günde Bir 500 cc/da	100lt suya 200cc
SÜS BİTKİLERİ	Bitki boyu 10 cm'ye gelince damlama sulama ile 15 günde Bir 2-3 LT/da	100lt suya 200cc

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

EURO N220

EC FERTİLİZER (AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ)

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ (DOMATES, BİBER,PATLİCAN,SALATALIK,ÇİLEK, KAVUN,KARPUZ VB.)	Fideler şaşırtıldıktan 1 haftasonra Çiçeklenme döneminde İlk meyve tutumunan sonra İlk hasattan önce	150cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
AĞAÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ(ELMA,KIRAZ, ŞEFTALİ,ARMUT,TURUNÇGİLLER, FINDIK,AYVA,KAYISI,FISTIK VB.)	Fideler şaşırtıldıktan 1 haftasonra Meyve tutumunan sonra (pettaller düşünce)	200cc / 100 lt su 250cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
BAĞ	İlk yaprakları açtığı dönemde Çiçeklenme ve salım uzatmada Koruk döneminde Meyvelere ben düşmeden	200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 250cc / 100 lt su	1 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (AYÇİÇEĞİ PATATES,PANCAR,PAMUK,TÜTÜN)	Çapadan sonra 15 gün ara ile	100cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da
SÜS BİTKİLERİ	Çiçekler 3-5 yapraklı iken Çiçek tohumcuğunun oluşumu öncesi İlk meyve dökümünden önce	200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su 200cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da 1 - 2 lt/da
YAPRAĞI YENEN BİTKİLER	Bitki boyu 10 cm olunca	100cc / 100 lt su	1 - 2 lt/da

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

EC FERTİLİZER - ÇÖZELTİ ÜRÜN GRUBU



EURO VIP MANGAN

EC FERTİLİZER (MANGANLI GÜBRE ÇÖZELTİSİ-MANGAN SÜLFAT İÇERİKLİ)



BİTKİLER	UYGULAMA DOZU		UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI
	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN	
SEBZELER: Domates,Biber,Patlıcan, Kabak	200-250gr/da	100-200gr/100lt su	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15cm Altına karıştırılır.
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER: Pamuk,Mısır,Patates Şekerpancarı,Yer fıstığı	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15cm Altına karıştırılır.
TARLA BİTKİLERİ: Buğday,Arpa,Yulaf Ayçiçeği	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15cm Altına karıştırılır,kardeşleme döneminde Ot ilacı ile karıştırılabilir.
ÇELTİK	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	2-3 yapraklı dönemde kutuya atılan ot ilacı ile verilir.
MEYVELER: Elma,armut,ayva	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra İlk,hasat öncesi ikinci uygulama yapılır.
Erik,kayısı,şeftali	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	Hasattan sonra uygulanır.
Ceviz,badem,kiraz	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	Çiçeklenme sonrası uygulanır.
Zeytin,bağ,fındık,fıstık	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	Uyanma ile başlanır ve 1 ay sonra tekrarlanır.
Narenciye,muz,kivi	100-200gr/da	100-200gr/100lt su	Baharda yeni sürgünlere uygulanır. Yaz ortası tekrarlanır.

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:



EC FERTİLİZER - ÇÖZELTİ ÜRÜN GRUBU



PROOF B

EC FERTİLİZER (ÇÖZELTİDE BORATLI GÜBRE)



BİTKİLER	YAPRAKTAN UYGULAMA	TOPRAKTAN UYGULAMA
SERA YETİŞTİRİCİLİĞİ (DOMATES, BİBER,PATLICAN,SALATALIK, FASULYE,BEZELYE)	80-100cc / 100lt su	300-400g/da
AÇIK TARLA YETİŞTİRİCİLİĞİ	80-100cc / 100lt su	330-400g/da
MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ	90-125cc / 100lt su	400-500g/da
MUZ	90-125cc / 100lt su	400-500g/da
BAĞ	75-100cc / 100lt su	300-400g/da
PATATES	90-125cc / 100lt su	400-500g/da
TARLA BİTKİLERİ(BUĞDAY,ARPA, NOHUT VB.)	80-100cc / 100lt su	200-300g/da
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (PAMUK,MISIR AYÇİÇEĞİ VB.)	80-100cc / 100lt su	200-300g/da
SÜS BİTKİLERİ	80-100cc / 100lt su	300-400g/da

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

FUEGO 7-7-7

EC FERTİLİZER (NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ)



BİTKİLER	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA
DOMATES,SALATALIK,PATLICAN	1,5-2,0 lt/da	100 lt suya 150-200cc
AÇIK ALAN SEBZELERİNDE; (MARUL,LAHANA,KARNABAHAAR, KABAK,KARPUZ,KAVUN)	2,0-3,0 lt/da	100 lt suya 150-200cc
SERALARDA-ÖRTÜ ALTI SEBZECİLİK	2,0-2,5 lt/da	100 lt suya 150-200cc
KESME ÇİÇEKÇİLİKTE	1,0-1,5 lt/da	100 lt suya 150-200cc
Y. ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE (ELMA,ARMUT VB.)	2,0-3,0 lt/da veya Ağaç başına 30-50cc	100 lt suya 150-200cc
SERT ÇEKİRDEKLİ MEYVELERDE (KAYISI,SEFTALİ,KIRAZ VB.)	2,0-3,0 lt/da veya Ağaç başına 30-50cc	100 lt suya 150-200cc
NARENCİYE	2,0-3,0 lt/da veya Ağaç başına 30-50cc	100 lt suya 150-300cc
ENDÜSTRİ BİTKİLERİNDE; (PAMUK,SOYA,MISIR,AYÇİÇEĞİ VB.)	1,0-1,5 lt/da	100 lt suya 150-300cc
TAHILLARDA (BUĞDAY,ARPA) YEŞİL VE ÇİM ALANLARDA	1,0-1,5 lt/da	100 lt suya 150-250cc

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:



EURO BİODOX

PH REGULATORU (for water & Soil pH Regulation)

Özellikleri:

- Solarizasyon döneminde %99 ıslah sağlar.
- Sudaki aldehitnitrojen sülfür ve siyanürü zararsız hale getirir. Kalıntı bırakmaz.
- Dirençli ve tekrarlayıcı hastalıklara maruz kalan suların kalitesini arttırır.
- Kimyasalların bozduğu pH'ı dengeler.
- Sulama suyunun kalitesini arttırır.
- Borulardaki tıkanıkları önler ve mevcut tıkanıkları giderir.
- Yıkama sularında zararlı kimyasallara karşı pH'ı dengeleyerek olumsuzlukları giderir.
- Mksimum fayda sağlar
- Suda ve toprakta kalıntı bırakmaz.

Çift komponentli bir üründür. 2 nolu ambalajı bidonun içerisindeki sıvı ile karıştırıp 6 saat sonra kullanınız.

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:



EURO REGULANS
PH DÜZENLEYİCİ / TUZLULUK GİDERİCİ

YAPRAKTAN UYGULAMA 300cc/100lt
TOPRAKTAN UYGULAMA 1-2lt/1000m2

Kullanım Dozu Ve Önerileri:

Sondaj sularının pH'larının genel olarak alkali karakterde olması ve bu sulara hazırlanan çözeltilerin istenmeyen Değişimlere neden olması kimi zaman istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Bu gibi istenmeyen durumları önlemek için alkalisuların pH'larının düşürülmesi ve yumaşatılması gerekmektedir. EURO REGULANS bütün bu problemlerin pH regülatörüdür.

EURO REGULANS;

- Yüksek pH'lı sularda oluşan çökme ve bozulmaları önler.
- Çeşitli suların pH seviyeisini istenilen düzeye getirerek gübrelerin etki sürelerini uzatır.
- Topraktaki tuzluluk sorunlarını ve bitkinin bu sorunlardan etkilenmesini minimum düzeye indirir.suda ve toprakta bulunan kirecin,bağlanmasına neden olan demir,çinko ve fosfatların bitki tarafından alınabilir forma dönüşmesini sağlar, toprağın fiziksel yapısını düzenler. Özel formülasyonu sayesinde toprak pH'ını tamponlayarak,besinleri bitki açısından yararışlı hale getirir.



EURO CALİBRE 5-0-30
PH DÜŞÜRÜCÜ

UYGULAMA ŞEKLİ

BİTKİLER	UYGULAMA ZAMANI	Yapraktan (100lt su)	Topraktan (lt/da)
SERA SEBZELERİNDE	BİTKİLERİN 4-5 YAPRAKLI DÖNEMİNDEN HASADA KADAR 4-5 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
AÇIK TARLA SEBZELERİNDE	BİTKİLERİN 4-5 YAPRAKLI DÖNEMİNDEN HASADA KADAR 4-5 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
KAVUN,KARPUZ,ÇİLEK	BİTKİLERİN 4-5 YAPRAKLI DÖNEMİNDEN HASADA KADAR 4-5 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
ELMA,ARMUT,AYVA	MEYVE TUTUMUNDAN İTİBAREN 20 GÜN ARA İLE 3-4 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
ŞEFATLI,KIRAZ,VIŞNE,KAYISI,ERİK	MEYVE TUTUMUNDAN İTİBAREN 20 GÜN ARA İLE 3-4 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
ÜZÜM,MUZ,İNCİR	ÇİÇEKLENMEDEN SONRA 20 GÜN ARA İLE 3-4 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
NARENCİYE,ZEYTİN,ÇAY	ÇİÇEKLENMEDEN SONRA 20 GÜN ARA İLE 3-4 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
FINDIK,CEVİZ,A.FISTIĞI,KESTANE	MEYVE TUTUMUNDAN İTİBAREN 20 GÜN ARA İLE 3-4 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
PAMUK,MISIR,AYÇİÇEĞİ,SOYA	BİTKİLERİN 4-5 YAPRAKLI DÖNEMİNDEN HASADA KADAR 1-2 KEZ UYGULANIR.	300-400 cc	2,50 lt
LAHANA,TURP,HAVUÇ,KEREVİZ KARNABAHAAR,SOĞAN,SARIMSAK	BİTKİLERİN 4-5 YAPRAKLI DÖNEMİNDEN HASADA KADAR 1-2 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
BAKLAGILLER,YEM BİTKİLERİVB.	BİTKİLERİN 4-5 YAPRAKLI DÖNEMİNDEN HASADA KADAR 1-2 KEZ UYGULANIR.	300-400 cc	2,50 lt
ŞEKER PANCARI,PATATES,ÇELTİK	YUMURU OLUŞUMUNDAN İTİBAREN HASADA KADAR 1-2 KEZ UYGULANIR.	300-400 cc	2,50 lt
KESME ÇİÇEK VB.	GELİŞME DÖNEMİNDE 360 GÜN ARA İLE 2-3 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt
BUĞDAYGİLLER (BUĞDAY,ARPA VB.	KARDEŞLENME DÖNEMİNDE 1-2 KEZ UYGULANIR.	300-400 cc	-----
YEŞİL ALANLAR	FAAL DÖNEMDE 15 GÜN ARA İLE 2-3 KEZ UYGULANIR.	200-300 cc	2,50 lt

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:



*Bitkinizi ayaklandıracak
tek çözüm...*

EURO ANTİVİR DEZENFEKTAN

VİRÜS İLACI (TOBRFV domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü.)

TOBBRFV: Tüm domates çeşitleri az veya çok duyarlıdır. TM direnç geni olmayan biber çeşitlerinde enfekte olabilir. TOBRFV tohum ile taşınan bir virüstür. Mekanik olarak yayılır. Önleyici hijyen önlemlerinde en etkili ilaç ANTİVİR'dir ve en etkili savunmadır.

Bu virüs dünyada ilk kez İsrail ve Ürdün'de ortaya çıktı (2014). Daha sonra Meksika, İtalya, Çin, Yunanistan, Almanya, ABD, İngiltere, Hollanda ve Türkiye'de 01/11/2015'den beri AB içinde karantina süresine sahiptir. TOBRFV tütün mozaik virüsü (VOMV) ile yakından ilgilidir. Ana korukçuları domates ve biberdir. TMO dirençli bitkiler 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda enfekte olabilmektedir. Sera içinde giysi, aydınlatma alet ekipmanları, böcekler ve en önemlisi bambus arıları virüsü yayır.

TOSWV TOMATA SPOTTED WILD VİRÜS: Domates lekeli solgunluk virüsü 80-110nm çapında küresel bir negatif duyarlı RNA virüsüdür. Trips türleriyle aktif olarak taşınırlar. Dünya çapında sera ve açık alanda üretim yapılan birçok sebze türlerinde önemli verim kaybına nedendir. Ülkemizde en çok biber türlerinde ve domatesten zararlıdır.

Tüm virüslerle mücadele yöntemleri;

- 1-temiz ve sağlıklı tohumlardan fide üretimi yapılmalıdır.
- 2-temiz fideliklerde fide üretimi yapılmalıdır.
- 3-daha fideliklerde fideler 2-3 yaprak iken ANTİVİR ile ilaçlama yapılmalı fideler seraya ulaşana kadar mutlaka fidelikte ilaçlama yapılmalı.
- 4-fideler üretim alanına gelmeden yetiştirme ortamı ve civarı mutlaka ANTİVİR ile ilaçlanmalı ayrıca gelen fideler mutlaka dikime gitmeden ANTİVİR ile ilaçlanmalıdır.
- 5-dikimle birlikte bitkiler haftalık olarak ANTİVİR ile düzenli olarak ilaçlanmalıdır.

ANTİVİR

- *ANTİVİR VİRÜSLER ÜZERİNDE ETKİLİ TEK METERYALDİR.
- *ANTİVİR 100 LT SUYA 10CC DOZUNDA KULLANILIR. BİTKİLERDE YAN ETKİSİ KESİNLİKLE YOKTUR.
- *ANTİVİR BİTKİLERDE VE MEYVELERDE KALINTI YAPMAZ.
- *ANTİVİR TÜM İNSEKTİSİT, FUNGUSİTLERE VE YAPRAK GÜBRELERİ İLE (ÖZELLİKLE ŞEKER GÜBRE VE ÜRE İLE) KARIŞTIRILIP YAPRAKLARA UYGULANIR.
- *ANTİVİR TOBRFV SPOTTED, SUN, TM, TOMV SARKA VİRÜSÜ, ZUCCİNİ MOZAİK VİRÜSÜ ZMV VE DİĞER TÜM BİTKİLERDE Kİ ZARARLI VİRÜSLERE KARŞI KULLANILAN BAŞARILI BİR METERYALDİR.
- *ANTİVİR KİSMEN PSEUDOMONAS SYRINGE BAKTERİLERİNDE DE ETKİLİDİR.
- *ANTİVİR DE BAŞARI İÇİN MUTLAKA YETİŞTİRME DÖNEMİ BOYUNCA KULLANILMALIDIR.
- *ANTİVİR ŞU ANDA VİRAL ETMENLERLE MÜCADELE ETKİLİ UYGULAMASI KOLAY BİR ÜRÜNDÜR.
- *ANTİVİR AŞMA ÜZÜM YELPAZE YAPRAK VİRÜSÜNDE DE ETKİLİ BİR METERYALDİR.



**ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:**

**PROFF COMBİ**

MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

BOR(B) , BAKIR (CU-SÜLFAT) , DEMİR (FE-SÜLFAT) , MANGAN (MN-SÜLFAT) , MOLİBDEN (MO) VE ÇİNKO (ZN-SÜLFAT)

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

SUDA ÇÖZÜNÜR BOR (B)	: %1
SUDA ÇÖZÜNÜR BAKIR (CU)	: %0,6
SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR (FE)	: %5
SUDA ÇÖZÜNÜR MANGAN (MN)	: %4
SUDA ÇÖZÜNÜR MOLİBDEN (MO)	: %0,3
SUDA ÇÖZÜNÜR ÇİNKO (ZN)	: %7

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

**PROFF FE**

ORGANOMİNERAL GÜBRE

İZ ELEMENT KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

ORGANİK MADDE	: %35
TOPLAM (HUMİK+FULVİK ASİT)	: %27
SUDA ÇÖZÜNÜR DEMİR (FE)	: %6
MAKSİMUM NEM	: %20

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

pH 2-4



EURO/TURK ACTIVE

TOPRAK ÇÖZÜCÜ

%45 CARBOXYLİC ASİD - %2 YARDIMCI MADDE

EURO ACTIVE:

- FAZLA GÜBRELEME SEBEBİYLE TOPRAKTA BİRİKEN KİMYASALLARIN PARÇALANMASINA VE YARARLI MAKRO-MİKRO ELEMENTLERİN ALINMASINA YARDIMCI OLUR.
- TOPRAKTA TABAN SERTLEŞMESİNİ ÖNLER VE TOPRAĞIN HAVA ALMASINI SAĞLAR.
- YÜKSEK PH'LI SULARDA,PH'DAN KAYNAKLANAN ÇÖKME VE DİĞER BOZULMALARI ÖNLER.
- GÜBRELERİN ETKİ SÜRELERİNİ UZATIR.
- TIKANMIŞ DAMLAMA BORULARININ AÇILMASINI SAĞLAR.
- YÜKSEK PH'LI (ALKALİ KARAKTERLİ) SULARDA PH DENGELİYİCİSİDİR.
- TUZLU TOPRAKLARDA TOPRAK TANSİYONUN (PH) DÜŞÜREREK BİTKİDE RAHATLAMA SAĞLAR.

ÇÖZÜNÜRLÜK:

SUDA TAVSİYE EDİLEN KONSATRASYONLARDA ÇÖZÜNÜR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖKMEZ VE KALINTI BIRAKMAZ.

KARIŞABİLİRLİK:

ÇOĞU İNSEKTİSİT,HERBİSİT,FUNNGUSİT VE GÜBRELER İLE KARIŞTIRILABİLİR.

KULLANIM DOZLARI: TOPRAKTAN UYGULAMA - TEK BAŞINA KULLANIMDA 5LT/DA
- GÜBRELER İLE KULLANIMDA 2LT/DA

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

EURO PROTEİN

PH DÜZENLEYİCİ / TUZLULUK GİDERİCİ

EURO PROTEİN:

- YÜKSEK PH'LI SULARDA OLUŞAN ÇÖKME VE BOZULMALARI ÖNLER.
- ÇEŞİTLİ SULARIN PH SEVİYESİNİ İSTENİLEN DÜZEYE GETİREREK GÜBRELERİN ETKİ SÜRELERİNİ UZATIR.
- TOPRAKTAKİ TUZLULUK SORUNLARINI VE BİTKİNİN BU SORUNLARDAN ETKİLENMESİNİ MİNİMUM DÜZEYE İNDİRİR.
- SUDA VE TOPRAKTA BULUNAN KİREÇİ BİTKİ TARAFINDAN ALINABİLİR KALSİYUMA ÇEVİRİR.TOPRAKTA BULUNAN KİREÇİN,BAĞLANMASINA NEDEN OLAN DEMİR, ÇİNKO VE FOSFATLARIN BİTKİ TARAFINDAN ALINABİLİR FORMA DÖNÜŞMESİNİ SAĞLAR, TOPRAĞIN FİZİKSEL YAPISINI DÜZENLER.ÖZEL FORMÜLASYONU SAYESİNDE TOPRAK PH'INI TAMPONLAYARAK, BESİNLERİ BİTKİ AÇISINDAN YARAYIŞLI HALE GETİRİR.

ÇÖZÜNÜRLÜK:

SUDA TAVSİYE EDİLEN KONSATRASYONLARDA ÇÖZÜNÜR. HİÇBİR ŞEKİLDE ÇÖKMEZ VE KALINTI BIRAKMAZ.

KARIŞABİLİRLİK:

ALKALİ İLAÇLAR VE BORDO BULAMACI HARİCİNDE DİĞER GELİŞİM DÜZENLEYİCİLER VE ZİRAAT İLAÇLAR İLE KARIŞABİLİR.

KULLANIM DOZLARI: YAPRAKTAN UYGULAMA 300cc/100lt
TOPRAKTAN UYGULAMA 1-2lt/1000m2

ÖNERİLEN SATIŞ FİYATI:
BAYİ ALIŞ FİYATI:

